

# SPRYCEL® Suspension

© AMBORA

Dieses Medikament wurde von Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin zur Behandlung Ihrer Krebserkrankung ausgewählt. Hier finden Sie wichtige Informationen zur Einnahme, möglichen Nebenwirkungen und zum Umgang mit Ihrem Krebsmedikament. Sie können aktiv an Ihrer Therapie mitwirken, indem Sie die nachfolgenden Hinweise und Einnahmeempfehlungen beachten und das Medikament regelmäßig einnehmen.

**Suspension:**  
weiße bis gelbe,  
trübe Flüssigkeit

## Allgemeine Angaben zum Medikament

SPRYCEL® 10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

**Wirkstoffname:** Dasatinib

**Einnahmegrund (Indikation):** Krebserkrankung der Blutzellen (sog. Chronische myeloische Leukämie – CML oder Akute lymphatische Leukämie – ALL, Philadelphia-Chromosom-positiv)

## Dosis und Behandlungsschema

**Wie oft und wann am Tag?**

**Empfohlene Anfangsdosis**

(ggfs. wird die Dosis im Laufe der Therapie angepasst):

1 x täglich \_\_\_\_\_ mg Dasatinib  
das entspricht:

**1 x täglich \_\_\_\_\_ ml SPRYCEL® Suspension**

Einnahme möglichst immer zur gleichen Uhrzeit.



**Mit oder ohne Mahlzeit einnehmen.**

## Gibt es Vorsichtsmaßnahmen zu beachten?

- Waschen Sie sich vor und nach der Einnahme die Hände. Angehörige sollten beim Umgang mit dem Krebsmedikament Einmalhandschuhe tragen. Falls Suspension versehentlich auf die Haut gelangt, waschen Sie die Stelle gründlich mit Wasser und Seife!
- Falls Sie oder Ihre Partnerin eine Schwangerschaft planen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Behandlungsteam. Dieses Arzneimittel kann Risiken für das ungeborene Kind mit sich bringen.
- Fahren Sie beim Auftreten von Schwindel oder Sehstörungen kein Auto und bedienen Sie keine gefährlichen Maschinen.
- Dasatinib Suspension (SPRYCEL® Pulver zur Herstellung einer Suspension) darf nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin durch Dasatinib Tabletten (z.B. SPRYCEL® Tabletten) ausgetauscht werden.

## Wie sollte das Medikament aufbewahrt werden?

- In der **Originalverpackung** belassen, um Verwechslungen zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die ungeöffnete Flasche bei **Raumtemperatur** (unter 25° C), vor Sonneneinstrahlung (nicht auf der Fensterbank), Feuchtigkeit (nicht im Bad) und Hitze (nicht in der Küche) geschützt lagern.
- Die **fertige Suspension** im **Kühlschrank** (2-8°C) lagern (maximal 60 Tage haltbar). Mit Milch, Joghurt, Apfelsaft oder Apfelmus gemischt, ist die Suspension maximal 1 Stunde (unter 25°C) haltbar.

## Welche Nebenwirkungen können auftreten (Auswahl)?

- Durchfall oder Verstopfung
- Übelkeit und/oder Erbrechen
- Appetitlosigkeit und/oder Geschmacksstörungen
- Nervenschädigungen (sog. Neuropathie) – z.B. Kribbeln, Taubheitsgefühle oder Schmerzen in den Händen und Füßen

