

# Pemazyre®

© AMBORA

Dieses Medikament wurde von Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin zur Behandlung Ihrer Krebserkrankung ausgewählt.

Hier finden Sie wichtige Informationen zur Einnahme, möglichen Nebenwirkungen und zum Umgang mit Ihrem Krebsmedikament.

Sie können aktiv an Ihrer Therapie mitwirken, indem Sie die nachfolgenden Hinweise und Einnahmeempfehlungen beachten und das Medikament regelmäßig einnehmen.

**4,5 mg:**  
weiße bis cremefarbene, runde  
Tablette, Prägung „4.5“

**9 mg:**  
weiße bis cremefarbene, ovale  
Tablette, Prägung „9“

**13,5 mg:**  
weiße bis cremefarbene, runde  
Tablette, Prägung „13.5“

## Allgemeine Angaben zum Medikament

Pemazyre® 4,5 / 9 / 13,5 mg Tabletten

**Wirkstoffname:** Pemigatinib

**Einnahmegrund (Indikation):** Krebserkrankung der Gallengänge (sog. Cholangiokarzinom), FGFR2-positiv

**Wirkungsweise:** Der Wirkstoff Pemigatinib ist ein sogenannter „Kinasehemmer“.

Kinasen sind Proteine, die Wachstumssignale innerhalb der Zellen weitergeben und am Krebswachstum und der Verbreitung von Krebszellen im Körper beteiligt sind. Pemigatinib hemmt u.a. die sog. „FGFR-Kinase“. Bei Patienten mit einer genetischen Veränderung von FGFR teilen sich die Krebszellen unkontrolliert. Das wird durch Pemigatinib verhindert.

## Dosis und Behandlungsschema

Wie oft und wann am Tag?

**Empfohlene Anfangsdosis**

(ggfs. wird die Dosis im Laufe der Therapie angepasst):

**Zyklisch einzunehmen** (Einnahme von Tag 1 bis 14, danach 7 Tage Pause = 21-Tage-Zyklus)

**1 x täglich 1 Tablette Pemazyre® 13,5 mg**



**Mit oder ohne Mahlzeit einnehmen.**

Wenn Sie...

- ...die Einnahme vergessen/versäumt haben: Einnahme kann nachgeholt werden, wenn es noch mindestens 20 Stunden bis zur nächsten geplanten Einnahme sind.
- ...nach der Einnahme erbrechen mussten: erbrochene Dosis nicht ersetzen.
- ...zu viele Tabletten eingenommen haben: bitte kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam.

Einnahme mit einem Glas Wasser möglichst immer zur gleichen Uhrzeit.

## Gibt es Vorsichtsmaßnahmen zu beachten?

- Lutschen, zerdrücken, zerkauen, zerschneiden oder zerbrechen Sie Ihre Tabletten nicht, sofern Sie keine anderslautenden Anweisungen erhalten haben.
- Waschen Sie sich vor und nach der Einnahme die Hände. Angehörige sollten beim Umgang mit dem Krebsmedikament Einmalhandschuhe tragen
- Falls Sie oder Ihre Partnerin eine Schwangerschaft planen, darf dieses Arzneimittel nicht eingenommen werden, da es das ungeborene Kind schädigen kann. Sprechen Sie in diesem Fall bitte mit Ihrem Behandlungsteam.
- Fahren Sie beim Auftreten von Ermüdung oder Sehstörungen kein Auto und bedienen Sie keine gefährlichen Maschinen.

## Wie sollte das Medikament aufbewahrt werden?

- In der **Originalverpackung** belassen, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei **Raumtemperatur**, vor Sonneneinstrahlung (nicht auf der Fensterbank), Feuchtigkeit (nicht im Bad) und Hitze (nicht in der Küche) geschützt lagern.

## Welche Nebenwirkungen können auftreten (Auswahl)?

- Durchfall oder Verstopfung
- Übelkeit
- Geschmacksstörungen
- Hand-Fuß-Syndrom (**cremen** Sie vorbeugend die Hände und Füße mindestens zweimal täglich ein)
- Nagelveränderungen
- Haarausfall, Haarveränderungen – z.B. Veränderung des Haarwachstums

- Entzündungen der Mund-/Rachenschleimhaut, Mundtrockenheit (achten Sie vorbeugend auf eine regelmäßige und gründliche, aber vorsichtige **Mundpflege**)
- Hauttrockenheit (achten Sie vorbeugend auf eine regelmäßige **Hautpflege**)
- erhöhter Phosphatspiegel im Blut (ggfs. erhalten Sie Hinweise bezüglich einer phosphatarmen Ernährung)
- Sehstörungen - z.B. verschwommenes Sehen, trockene Augen (nach Bedarf können vorbeugend befeuchtende Augentropfen verwendet werden)
- Ermüdung

Bitte informieren Sie bei folgenden Beschwerden umgehend Ihr Behandlungsteam:

- Fieber über 38°C
- Durchfall, der sich mit Medikamenten nicht stoppen lässt
- wenn Sie länger als 3 Tage keinen Stuhlgang hatten
- Muskelschwäche und/oder -krämpfe, Verwirrtheit, Herzklopfen - als möglicher Hinweis auf einen erhöhten Phosphatwert im Blut
- Sehstörungen - als möglicher Hinweis auf eine Schädigung der Augen
- **oder wenn Sie unter anhaltenden oder anderen unklaren Beschwerden leiden!**

## Gibt es Wechselwirkungen mit Medikamenten oder Lebensmitteln?

Ihr Krebsmedikament kann durch andere Medikamente beeinflusst werden. Auch mit Präparaten, die Sie ohne Rezept erhalten (z.B. pflanzliche Mittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine) kann es Wechselwirkungen geben. Bitte informieren Sie deshalb Ihr Behandlungsteam, dass Sie dieses Krebsmedikament einnehmen! Das ist besonders wichtig, wenn sich Ihre Medikamente ändern.

Folgende Wechselwirkungen mit rezeptfreien Präparaten und Lebensmitteln müssen beachtet werden:

- Nehmen Sie bitte keine **johanniskrauthaltigen** Tabletten/Kapseln oder Tees ein, da sonst die Wirkung Ihres Krebsmedikaments abgeschwächt sein kann.
- Trinken Sie bitte keinen Grapefruitsaft und essen Sie keine **Grapefruits** und Bitterorangen (Sevilla-Orangen, Pomeranzen) oder Bitterorangen-Produkte, da es sonst verstärkt zu Nebenwirkungen Ihres Krebsmedikaments kommen kann.
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Behandlungsteam, falls Sie Arzneimittel zur dauerhaften Neutralisierung der Magensäure („saures Aufstoßen“) mit sog. **Protonenpumpenhemmern** wie Omeprazol oder Pantoprazol (z.B. Omep®, Nexium control®, Pantozol Control®) einnehmen. Protonenpumpenhemmer können möglicherweise die Wirkung Ihres Krebsmedikaments abschwächen.
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Behandlungsteam, falls Sie bestimmte Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die **Phosphat** enthalten oder den Phosphatspiegel im Blut erhöhen können (z.B. bestimmte Abführmittel, bestimmte Mittel gegen Sodbrennen, Präparate mit Vitamin D), da diese das Auftreten von Nebenwirkungen begünstigen können.

## Wen kann ich bei Fragen anrufen?

Ihr Behandlungsteam:

Stempel der Klinik / Praxis / Apotheke

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Bei lebensbedrohlichen **Notfällen**: 112